

Loup gris


Canis lupus

Famille : canidés

Généralités : après avoir été pourchassé et exterminé de presque toutes les campagnes d'Europe, ce grand prédateur revient naturellement sur ses anciens territoires.

Habitat : il vit essentiellement en forêt et dans les montagnes, mais il peut traverser des paysages variés durant ses phases de colonisation.

Traces et indices : le loup déambule souvent le long des haies, des voies ferrées, sur les pistes forestières ou sur les lignes de crête. Opportuniste, il s'attaque aussi aux animaux domestiques, notamment les moutons laissés la nuit sans surveillance dans un enclos non adapté. Il adopte alors un comportement dit de *surplus killing*, laissant derrière lui plus de proies tuées qu'il n'en a besoin. Les chiens domestiques agissent de même et il est très difficile de distinguer le véritable coupable.




Au trot, sa **piste** est une ligne pointillée du fait que les pattes sont posées exactement au même endroit.

La piste d'un chien est souvent désordonnée ou hésitante, avec les empreintes des pattes avant et arrière distinctes.



marque de morsure à la gorge ou simples trous des canines




Crottes de 2,5 à 3 cm de diamètre et de 15 à 30 cm de long, constituées de poils, de couleur variable et à l'odeur prenante.

Chevreuil fraîchement tué par le loup. En général, il ne reste de la **carcasse** que la colonne vertébrale, le crâne et de longs os, ou rien.

À ne pas confondre

Différencier les **empreintes de canidés** est très difficile, voire parfois impossible. La trace du renard est ovale, celle du chien est plus ronde et ramassée. Les pattes avant du chacal et du loup possèdent des doigts médians soudés à leur base ne marquant pas systématiquement. L'empreinte de loup, large et avec des doigts écartés, est similaire à celle d'un gros chien.

pelote plantaire plus proche des doigts médians



renard roux
(longueur 4-6 cm,
largeur 3-4,5 cm)

griffes des doigts externes souvent orientés vers les côtés



chien domestique
(longueur et
largeur variables)

doigts médians soudés



chacal doré
(longueur 5-6 cm,
largeur 3,5-4,5 cm)



loup gris
(longueur 8-11 cm,
largeur 7-10 cm)

Écureuil roux

Sciurus vulgaris

Famille : sciuridés

Généralités : diurne, ce célèbre petit acrobate n'hiberne pas. Tout en jouant à cache-cache avec les intrus, il redouble même d'activité pour se nourrir et se reproduire en hiver.

Habitat : mammifère arboricole, il vit dans les forêts ainsi que dans les parcs et jardins arborés, jusqu'au cœur des villes.

Traces et indices : ses nombreux restes de repas jonchent le sol de son territoire surtout en hiver. L'écureuil décortique faines, noisettes et cônes de résineux (épicéa, pins...) assis sur une souche ou une branche. Sa table se signale par un amoncellement d'écaillés, de coques rongées et de pommes de pin. Il construit en moyenne 5 nids dans un rayon de 100 m.




Sa **piste** est une succession de 4 **empreintes** en trapèze qui commence et se termine toujours entre 2 arbres. Sautillant pour se déplacer au sol, l'écureuil se réceptionne sur ses pattes avant puis pose ses pattes arrière, qui s'impriment donc devant.

4 doigts



patte avant
(3 x 2 cm)

5 doigts




patte arrière
(5 x 3 cm)

longue
pelote
plantaire



plumet d'écaillés
intactes



base
effilochée

petits
lambeaux

Après les avoir arrachés de leur rameau et rongés grossièrement (vs mulot, > p. 31), l'écureuil abandonne de nombreux **cônes décortiqués**.



Il coupe les jeunes **rameaux d'épicéa** de 5 à 10 cm de long pour grignoter fleurs et bourgeons, puis les abandonne en nombre sous l'arbre.

cassure nette



sillon rongé



coquille
fendue
en 2

Il ouvre noix et **noisettes** en 2, en rongant un sillon à partir de la pointe de la coque pour y insérer ses incisives et faire levier.



amas opaque
et globuleux de
branchettes, de
feuilles et de mousses

Sa **hotte** (nid) est une boule compacte et calfeutrée, d'un diamètre de 30 cm, installée en haut d'un arbre.

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

Famille : léporidés

Généralités : ce petit lagomorphe vit en colonie dans des terriers regroupés et reliés appelés *garenne*.

Habitat : introduit, il est présent dans divers milieux buissonneux tels que les landes, garrigues, bocages, friches, cultures, dunes, parcs urbains et même ronds-points ! Il apprécie les terrains ensoleillés, sablonneux et profonds.

Traces et indices : le lapin gratte ou creuse le sol autour de la garenne pour marquer son territoire et pour construire terriers, tunnels et rabouillères (galeries à une seule entrée avec une chambre pour la mise bas). Les zones herbeuses de son domaine sont si régulièrement broutées qu'elles ressemblent à un *green* de terrain de golf. En hiver, il peut écorcer à faible hauteur (moins de 40 cm) les arbres et les branches basses ou tombées au sol.



souvent
couvert d'un
roncier

coulées,
déblais et
sol gratté

herbe
broutée au
ras du sol



garenne

Terrier creusé de préférence dans un talus et sous un buisson. L'entrée est devancée de coulées, de déblais et de crottes.

entrée de 10 cm
de large ou plus



Sa **piste** est une succession de bonds dessinant des Y. La patte avant mesure 4 cm de long et 2,5 cm de large. La patte arrière est longue de 6,5 cm.



Petits trous dans le sol mêlés de crottes, les **grattis** marquent le territoire des mâles.



patte arrière


Empreintes sans pelote plantaire, comme celles du lièvre (> p. 39), mais plus petites.

patte avant



fibres
végétales

Le lapin défèque souvent dans des crottoirs appelés **pétouillers**, jonchés de **crottes** sphériques de 0,6 à 1,2 cm de diamètre.



pétouiller

Lièvre d'Europe


Lepus europaeus

Famille : léporidés

Généralités : plus grand que son cousin le lapin, ce spécialiste des courses bondissantes est aussi plus discret et solitaire.

Habitat : appréciant les milieux ouverts, il vit dans les prés, les champs, les haies, mais aussi dans les petits bois, les lisières et les forêts claires.

Traces et indices : le lièvre laisse d'interminables pistes par temps de neige, jalonnées de jets d'urine et de crottes. Avec la rosée, ses pattes mouillées marquent parfois de manière éphémère la route goudronnée qu'il a traversée. Contrairement au lapin de garenne (> p. 36), il n'utilise pas de crottoir, ne creuse pas de terrier et se repose dans des gîtes éphémères, tapi dans l'herbe, dans les feuilles mortes ou dans un champ.



patte avant

patte arrière

Les **empreintes** de ses pattes arrière sont longues de 6 à 9 cm et larges de 3,5 cm. Celles des pattes avant, plus petites, mesurent 5 à 6 cm de long et 3 cm de large.



Comme le lapin, le lièvre sectionne les végétaux avec ses incisives, jusqu'à 50-70 cm de hauteur (vs cervidés, > p.25), laissant derrière lui des **rameaux abrutis** caractéristiques.



coupure oblique et nette sur toute la section du rameau



Crottes arrondies et fibreuses, de 1,5 à 2,2 cm de diamètre, jamais en grand nombre.

quelques crottes

végétation aplatie

Le lièvre se tapit au sol dans des gîtes temporaires : les **formes**.

Pie bavarde

Pica pica

Famille : corvidés


Généralités : opportuniste, cet élégant corvidé apprécie la proximité des humains en restant farouche et très méfiant.

Habitat : la pie affectionne la campagne cultivée et boisée, les haies et le bocage, les parcs, les vergers et les jardins arborés, en particulier autour des villes et des villages.

Traces et indices : la silhouette ronde de son nid est aisément reconnaissable, même à distance. Cet oiseau ingénieux en fabrique plusieurs au cœur de son territoire, certains pour tromper les prédateurs. En période de mue, entre juin et octobre, il arrive fréquemment de trouver ses vieilles plumes usées, aux reflets irisés.



Son **nid** en coupe muni d'un toit est bâti en haut d'un arbre ou d'un arbuste épineux. Son diamètre est d'environ 30 à 40 cm.



Les **rectrices** (plumes de la queue) atteignent 25 cm. Les **remiges** (plumes des ailes) les plus grandes mesurent environ 17 cm. Toutes possèdent des reflets irisés bleu, vert et violet électriques.

Empreinte segmentée typique des corvidés, de 4 à 5 cm de long et 2,5 cm de large, aux doigts rapprochés. La pie saute, laissant une série de traces parallèles, ou marche.